

Autores: Laura Alonso Viana, José Couceiro Otero, María de los Ángeles De La Red Gallego, Olga María Vélez García, Juan Rodríguez Fernández., Manuel Rubén Sánchez Crespo

Unidad de mano. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Santander, Cantabria, España.

INTRODUCCIÓN

Las fracturas de la falange distal suceden con frecuencia y generalmente consolidan o resultan en pseudoartrosis asintomáticas. El tratamiento clásico de las pseudoartrosis sintomáticas en este área consiste en la retirada del fragmento óseo. Las pseudoartrosis que afectan a la diáfisis de la falange pueden no ser susceptibles de tratarse mediante éste método, precisando opciones de tratamiento más complejas.

Objetivo: Describir los resultados de nuestra unidad de mano tratando pseudoartrosis sintomáticas de la falange distal mediante el método de Kim, Ki y Cho.



MÉTODO

Presentamos dos casos clínicos de pacientes con fracturas abiertas de falanges distales del tercer dedo, que evolucionaron hacia pseudoartrosis sintomáticas. Ambos fueron tratados con curetaje percutáneo desde la punta del dedo y posterior inserción de un perno óseo cortico-esponjoso obtenido del olécranon.

RESULTADOS

En ambos casos se consiguió la consolidación de la fractura. No se precisó de fijación suplementaria con agujas o tornillos. Ambos pacientes se reincorporaron a sus actividades previas a las ocho semanas y se encontraban satisfechos con el resultado. No molestias de la zona donante.

